

Содержание в трех- и четырехъярусных клеточных батареях; содержание в двухъярусных ступенчатых клеточных батареях.

В птицеводческих комплексах промышленного типа 25% кур-несушек содержатся в напольных клетках, 63% - в трехъярусных батареях, около 9% - в четырехъярусных клеточных батареях и около 1% - в трехъярусных ступенчатых батареях.

Племенные куры-несушки. В конце 70-х годов однофазный напольный способ содержания кур-несушек был успешно заменен содержанием в двухъярусных групповых клетках с естественным спариванием.

Вы хотите купить [вагонку оптом](http://vagonka.com.ua) ? Подробности Вы можете узнать на сайте <http://vagonka.com.ua>.

Племенные куры с однодневного до 10-недельного возраста выращиваются на глубокой подстилке при плотности 8-12 птиц на 1 м² площади птичника. После этого их переводят в клеточные батареи для кур-несушек. Клетки для группового содержания имеют следующие габариты: длина 2000 мм, ширина 940 мм и высота 700 мм.

В начале яйцекладки в каждой клетке содержатся 36 кур и 4 петуха. Устройство для несушек гнездободных приспособлений и насестов привело к росту производительности птиц. В ГДР 86% племенных кур-несушек содержатся в двухъярусных групповых клетках типа L112.

Родительские бройлеры содержатся в типовых птичниках размером 12х88 м, с кондиционированием воздуха, на глубокой подстилке. При этом применяют преимущественно однофазное содержание. Родительские бройлеры с однодневного возраста и до конца периода яйцеклетки остаются в одном и том же птичнике, который разделен на 5-6 отделений проволоочными решетками, перпендикулярными к оси помещения.

В такой птичник переводят 6500 цыплят-курочек и 700 цыплят-петушков. К началу яйцекладки (возраст 25 недель) поголовье птиц состоит из 5500 кур и 550 петухов.