Содержание на решетчатом полу оказалось наиболее эффективным, поскольку при этом вся поверхность пола птичника покрыта металлической решеткой и обеспечивается подпольное удаление помета. В данном случае применяются те же кормо- и водоподающие установки, что и при напольном содержании на подстилке (кормораздаточные линии с закрытыми трубчатыми транспортерами, круговые клапанные автопоилки).

В первой и второй фазах применяют комбинированное содержание на подстилке и решетчатом полу или только на решетчатом полу. Однако сейчас преобладает тенденция применять содержание только на решетчатом полу в птичнике и с выгулом, с подпольным удалением помета с помощью скреперного ковша и водяной струи или с помощью смыва водой из подпорного канала.

В перспективе предполагается откорм уток перевести на круглогодичное содержание в птичнике при высокой плотности на проволочной сетке или в напольных клетках.

Содержание овец было переведено на промышленную основу в последнюю очередь, так как допустимая концентрация этих животных в одном месте ограничена из-за слишком труднопреодолимых для людей и овец расстояний к местонахождению пригодных кормов.

Работу на пастбищах при 245 пастбищных днях в год на подножных кормах трудно механизировать, и при средних размерах стада 372 овцы (1964 г.) механизация стойлового содержания всего на 120 дней в год невыгодна. Необходимо иметь не менее 1200 овец, чтобы можно было обеспечить бригадную работу в трех стадах и экономически выгодную механизацию.

В последние годы механизация коснулась и содержания овец, и все чаще смешанные стада уступают место специализированным стадам. Различают стада откормочных ягнят, годовалых овец, овцематок и баранов-валухов (основных производителей шерсти). Овцы переносят температуры до 32°С.